OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

12,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

TRENTE-DEUXIÈME FASCICULE

(10 juin 1920)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
E. REVÉRÉ, SUCCESSEUR

1920

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

Nouveautés diverses[1]

Demonax diversefasciatus n. sp. Parum elongatus, niger, dense griseo pubescens, elytris nigro bifasciatis (fascia prima discoidalis subobliqua, secunda mediana obliqua) et post medium nigro fulvo fasciatis. Long. 11-12 mill. Yunnan. — Voisin de *D. Marnei* Pic, avec les dessins des élytres différents.

Demonax albobifasciatus n. sp. Parum elongatus, niger, parum pubescens, infra pro parte albo notato, scutello albo, elytris ad basin albo virgulatis, ad medium albo fasciatis, fascia antice ad suturam remota, postice albo fasciatis. Long. 10 mill. Tonkin. — Voisin de *D. Fochi* Pic, plus robuste, avec les dessins blancs des élytres moins grêles et en partie différents.

Demonax corallipes n. sp. Angustatus, subparallelus, niger, luteo pubescens, thorace in disco nigro binotato, antennis pedibusque rubris, femoribus pro parte pubescentibus, elytris signaturis nigris ornatis, postice, in singulo, uni (forma typ.), aut bimaculatis (v. implicatus), aliquot ad humeros nigro notatis (v. bisbinotatus). Long. 12-16 mill. Chine ; Yunnan. — Ressemble à *C. Clemenceaui* Pic, distinct, à première vue, par les membres non foncés, les dessins foncés des élytres réduits. Peut se placer provisoirement près de *D. Marnei* Pic.

Clorophorus angustatus n. sp. Angustatus, niger, luteo pubescens, elytris in singulo ad basin bi et oblique nigro

(1) Les types des nouveautés sont tous dans la coll. Pic.

maculatis, ad et post medium reducte nigro fasciatis ; pedibus gracilibus. Long. 10 mill. Chine. — Voisin de *C. Clemenceaui* Pic, plus étroit, prothorax immaculé, etc.

Clorophorus kinganus v. nov. innotatus. Elytris uniformiter griseo pubescentibus, thorace subgloboso. Chine.

Clorophorus Butleri n. sp. Elongatus, niger, luteo pubescens, thorace in disco nigro bimaculato, elytris ad basin nigro bilineatis, lineis postice junctis, ad medium bimaculatis, maculis, postice junctis antennis pedibusque rufis. Long. 15 mill. ? Tonkin. — Peut se placer près de *C. notabilis* Pascoe, élytres moins atténués postérieurement et à dessins différents.

Prothema lineata Pic, du Thibet, noir, avec la tête et le prothorax en partie (à large espace médian dénudé), le dessous du corps largement pubescent de gris ou de jaunâtre, élytres à large bande pubescente suturale à contours irréguliers et ligne longitudinale antérieure externe, peu longue, de même pubescence.

Cloridolum implicatum n. sp. Elongatus, parum nitidus, viridescens (forma typica), aliquot elytris lateraliter pro parte purpureo aut aurato metallicis (v. *semipurpureum ;* antennis satis brevibus ; thorace in disco gibboso, non plicato, irregulariter sculptato, lateribus sat valide tuberculatis ; elytris dense ruguloso-punctatis. Long. 23-30 mill. Yunnan. — Voisin de *C. thaliodes* Bates, mais prothorax autrement conformé.

Monohammus multiperforatus n. sp. Satis brevis, niger, griseo pubescens et pro parte fulvo hirsutus, supra sat dense et pro parte irregulariter foveato-punctatis. Long. 15 mill. Yunnan. — Espèce très distincte par sa large ponctuation en fossette ; à placer près de *M. beryllinus* Hope.

Monohammus talianus v. nov. sparsenotatus. Elytris sat sparse luteo maculatis, femoribus rufis. Chine.

Monohammus albescens n. sp. Satis elongatus, niger, dense albo pubescens, supra sparse nigro maculatus, an-

tennis annulatis. Long. 28 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *M. beryllinus* Hope, plus allongé et revêtement différent.

Scaphidium minutum n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, rufus, antennis ad medium nigris, thorace postice sulcato; elytris ad basin transverse fortiter punctatis, ad suturam fortiter sulcatis, in disco minutissime et sparse punctatis. Long. 3,5 mill. Kina-Balu. — Voisin de *S. Waterstradti* Pic et distinct, à première vue, par la fine ponctuation du disque des élytres.

Bacoceridium conuroides n. sp. Elongatus. fulvo pubescens, niger, antennis, pedibus pygidioque testaceis, elytris rufis in disco pro parte brunneis. Long. 3 mill. S.-Leone. — Diffère de *B. pallipes* Kr. (ex description) par la coloration largement rousse des élytres.

Scaphosoma Gallienii n. sp. Oblongus, nitidus, minute sed distincte punctatus, niger, antennis pedibusque testaceis, abdomine apice rufo marginato ; stria suturalis ad basin parum prolongata. Long. 2 mill. Madagascar. — A placer près de *S. rufifrons* Frm., tête et extrémité de l'abdomen, plus foncées.

Scaphosoma latum n. sp. Subovatus, latus, nitidus, niger, capite, thorace, antennis, pedibus abdomineque postice testaceis, elytris piceis, apice luteo notatis, distincte sat fortiter punctatis. Long. 2,5 mill. Iles Philippines. — Voisin de *S. Dohertyi* Pic, élytres autrement colorés, à ponctuation plus écartée.

Baeocera Dufaui n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, antennis, pedibus, capite abdomineque testaceis, thorace elytrisque nigris aut nigro-piceis (forme type), aliquot thorace rufo et elytris late piceis (v. tricolor), aliquot rufescens (v. unicolor) ; stria suturalis reducta. Long. 11,5 mill. Guadeloupe. — A placer près de *B. ruficolor* Pic, plus étroit avec la strie présuturale plus courte.

Baeocera atricollis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus,

niger, capite antice, antennis, elytris, pedibus abdomineque postice testaceis ; stria suturalis ad basin prolongata. Long. 2 mill. Chili. — Diffère de *B. chilensis* Reitt. par la coloration et la strie plus longue.

Baeocera chilensis v. nov. Germaini. Oblongo-elongatus, niger, elytris aliquot apice rufescentibus, antennis pedibusque testaceis ; stria suturalis reducta. Chili.

Scaphidium Fairmairei Port. (1) Elongatus, parum nitidus, niger, elytris rufis, apice late nigro notatis. Long. 7 mill. Madagascar. — A placer près de *S. basale* Cast.

Scaphidium angustatum Port. Angustatus, nitidus, niger, elytris antice parum late rufo-testaceo subfasciatis. Long. 5-5,5 mill. Madagascar. — A placer près de *S. interruptum* Frm.

Scaphidium vagefasciatum Port. Oblongus, nitidus, niger, elytris antice sat anguste et transverse testaceo fasciatis. Long. 5 mill. Madagascar. — Moins allongé que le précédent avec les élytres plus étroitement marqués de clair.

Scaphidium quadrillum v. nov. biconjuntum. Maculis elytrorum ad suturam junctis. Madagascar.

Scaphidium Gounellei n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufus, antennis apice, pectore pedibusque nigris, tarsis rufescentibus, thorace antice nigro bimaculato. Long. 5 mill. Brésil. — Très voisin de *S. bipunctatum* Redt., distinct, à première vue, par les cuisses entièrement noires.

Scaphidium variegatum v. nov. Portevini. Signaturis nigris mediis thoracis junctis. Cayenne.

Cyparium collare Port. Subovatus, nitidus, niger aut ni-

(1) Cette espèce de *Scaphidiidæ* et celles qui suivent proviennent de la collection Portevin, récemment acquise. Les noms suivis de Port. sont des noms *in litteris* de notre collègue Portevin, qui n'ont pas besoin d'être changés.

gro-piceus, thorace, pedibus, antennisque pro parte rufis, abdomine apice testaceo, nigro notato. Long. 3 mill. Brésil. — A placer près de *C. Sallei* Matt.

Cyparium Grouvellei Port. Subovatus, nitidus, nigro-piceus, capite, antennis ad basin pedibusque rufis, abdomine apice pygidioque testaceo marginatis. Long. 3 mill. Brésil. — Voisin du précédent.

Cyparium ferrugineum Port. Subovatus, nitidus, ferrugineus, antennis pedibusque pallidioribus. Long. 3 mill. Brésil. — Espèce bien distincte par sa coloration générale claire.

Scaphosoma sinense Port. Nitidus, niger, labro, antennis, pedibus, abdomine pro parte elytrisque apice late testaceis, elytris antice rufo notatis. Long. 2 mill. environ. Chine. — A placer près de *S. hæmorrhoidale* Reitt.

Scaphosoma Portevini n. sp. Parum latus, nitidus, nigro-piceus, labro, antennis, pedibus, abdomine elytrisque rufescentibus. Long. 2 mill. environ. Chine. — Peut se placer près de *S. castaneipenne* Reitt., mais élytres assez finement et éparsément ponctués, strie suturale peu recourbée à la base.

Scaphosoma Simoni Port. Parum latus, nitidus, rufescens, thorace postice nigro marginato. Long. 2 mill. Manille (Simon). — Très distinct du précédent, par la strie suturale profonde et les élytres à ponctuation forte.

Scaphosoma rubripes Port. Oblongus, nitidus, niger, labro, antennis, pedibus abdomineque apice rufis, elytris apice breve rufo marginatis. Long. 2 mill. Brésil. — Espèce voisine de *S. lunatum* Matt., à élytres assez finement et éparsément ponctués, strie suturale assez longuement recourbée à la base.

Scaphosoma maximum n. sp. Grandis, oblongo-elongatus, niger, capite antice, antennis, pedibus pygidioque rufis ; aliquot capite thoraceque pro majore parte rufes-

centibus (var. **diversicolor**). Long. 4 mill. Madagascar. — Espèce remarquable par sa grande taille, la strie élytrale prolongée à la base presque jusqu'aux épaules et très ponctuée longitudinalement.

Trixagus Astruci n. sp. Parum elongatus, postice modice attenuatus, nitidus, nigro-piceus, capite, antennis pro parte pedibusque rufescentibus ; fronte bicarinato ; thorace lateraliter subsinuato, postice late bidepresso, mediocre punctato ; scutello elongato ; elytris striatis, intervallis parum punctatis. Long. 3 mill. Indes : Kurseong. — A placer près de *T. rugifrons* Bouv.

Micropodabrus n. gen. Capite postice valde attenuato, antennis difformibus, articulo 2° breve, 4° sinuato, supra excavato, articulis 5-11 elongatis ; thorace elongato ; elytris mediocre et longe dehiscentibus ; tarsis elongatis, articulo 4° parum lobato. — Voisin de *Podabrus* West. par divers caractères et distinct, à première vue, par la structure des antennes.

Micropodabrus obscurus. Elongatus, parum nitidus, niger, capite ad oculos, antennis ad basin, infra corpore coxisque testaceis ; thorace marginato, sulcato, antice attenuato ; elytris ruguloso-punctatis. Long. 5 mill. Tonkin.

Stenothemus innotaticollis n. sp. Elongatus, parum nitidus, testaceus, antennis brunneo annulatis ; elytris ad basin brunneo marginatis et fere indistincte maculatis ; pedibus longissimis. Long. 12 mill. Indes. — Voisin de *S. Andrewesi* Brg., pattes plus longues, prothorax immaculé et moins arrondi sur les côtés, etc.

Cladiodrilus n. gen. Capite breve, oculis distantibus ; articulis 4 et sequentibus antennarum ramosis ; thorace subquadrato ; pedibus parum compressis. — Peut se placer près de *Harmatelia* Walker, antennes à rameaux plus courts et larges, forme de l'avant-corps différente, etc.

Cladiodrilus minutus n. sp. Parum nitidus, subparalle-

lus, piceus, thorace pro parte testaceo marginato, scutello pedibus pro parte abdomineque testaceis ; thorace fortiter et sat sparse punctato ; elytris minute rugulosopunctatis. Long. 4 mill. Tonkin.

Diabolattalus n. gen. Capite particulare, ad oculos marginato, antice biimpresso et cornuto. — Genre voisin de *Hedibioattalus* Pic et très différent par la structure de la tête qui n'est pas largement creusée et présente une corne courte et large, tronquée au sommet.

Diabolattalus diversipes n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, nigro-cyanescens, elytris violaceis, antennis ad basin, infra corpore, femoribus anticis et intermediis pro parte testaceis. Long. 4 mill. Tonkin.

Pseudocolotes bisulcatus n. sp. Oblongus, fere opacus, nigro-subænescens, antennis, tibiis tarsisque testaceis ; elytris subdepressis, in singulo ad suturam antice sulcatis. Long. 2 mill. Zanzibar. — Peut se placer près de *P. nairobianus* Pic.

Troglops magniceps n. sp. Elongatus, parum nitidus, rufo-testaceus, capite postice, antennis apice, pectore abdomineque nigris, elytris viridescentibus ; capite lato, in mare excavato et medio breve tuberculato, ♀ simplice, subexcavato ; thorace parum breve, postice attenuato ; femoribus elongatis, posticis ad basin nigro notatis. Long. 3-3,3 mill. Abyssinie : Addis ababa. — Diffère de *T. latithorax* Pic, par le prothorax moins large, la tête marquée de foncé derrière les yeux, etc.

Astylus (1) **diversipes** n. sp. Elongatus, nitidus, niger, antennis, tibiis tarsisque testaceis, elytris nigris, testaceo cinctis, in disco testaceo costatis et apice late testaceis. Long. 7 mill. Bolivie. — Voisin de *A. subdisjunctus* Pic, distinct, à première vue, par les cuisses foncées, les élytres plus nettement et largement foncés sur le disque.

(1) *Astylus vittatus* Gorh. (1882) est à muter, à cause de *vittatus* Kirsh (1865) : je propose le nom de **indentatus**.

Astylus marginatus n. sp. Oblongo-elongatus, fere opacus, niger, elytris testaceis, in disco late nigro bilineatis et ante apicem nigro maculatis ; thorace fortiter marginato, postice valde sinuato, elytris bicostatis. Long. 6 mill. Brésil. — Plus robuste que *A. santiagonensis* Pic avec les élytres bordés de testacé le prothorax plus relevé sur les bords.

Dasytes aplocneiformis v. nov. diversepunctatus. Piceo-ænescens, antennis, tibiis tarsisque rufis, elytris testaceo-ænescentibus, fortiter sat parum dense punctatis ; thorace sat fortiter et sparse punctato. Cachemir.

Eulobonyx Guerryi n. sp. Elongatus, nitidus, viridi-metallicus, capite antice, palpis, pedibus abdomineque apice testaceis, antennis testaceis, apice brunnescentibus ; thorace late, sulcato ; elytris parum distincte asperatis. Long. 7-8 mill. Chine. — Diffère de *E. Kashmirensis* Frm., par le prothorax nettement moins large que les élytres, la coloration plus verte, etc.

Eulobonyx inæqualis n. sp. Elongatus, nitidus, viridi-subcupreus, capite antice, palpis, antennis, pedibus abdomineque apice testaceis ; thorace lato, subsulcato ; elytris irregulariter impressis et asperatis. Long. 8 mill. Indes : Murree. — Espèce très distincte de la précédente, et des autres, par la sculpture élytrale et les antennes entièrement testacées.

Eulobonyx granulatus n. sp. Elongatus, nitidus, viridi-cupreus, capite antice, palpis, antennis, pedibus abdomineque apice testaceis ; thorace parum breve, postice valde attenuato, sulcato ; elytris distincte sat regulariter granulatis. Long. 7 mill. Indes. — Distinct du précédent, par le prothorax plus long et plus étroit, la sculpture élytrale.

Pelecophoromorphus n. gen. Thorace lateraliter valde marginato, postice valde sinuato-inciso, angulis posticis rectis, acutis ; oculis parum prominulis ; elytris postice regulariter attenuatis. — Très voisin de *Othnius* Lec., avec

divers caractères communs, mais prothorax de structure différente, yeux peu saillants, ne débordant pas le prothorax, élytres longs, régulièrement atténués postérieurement dès la base.

Pelecophoromorphus Mocquerysi n. sp. Elongatus, postice valde attenuatus, mediocre pubescens, viridi-metallicus, antennis ad basin pedibusque testaceis, abdomine rufescente, elytris antice pallido lineatis et post medium pallido maculatis. Long. 6-6,5 mill. Gabon. — Cette espèce a un faciès de *Pelecophorus* Latr., avec des pattes et antennes de structure bien différente.

Othnius s. g. nov. Macroothnius. Major, elytris antice et apice distincte impressis ; thorace lateraliter mediocre marginato, postice valde distincte inciso et bidentato.

Macroothnius ruficornis n. sp. Robustus, apice attenuatus, nitidus, mediocre pubescens, rufescens, supra corpore, capite postice thoraceque pro majore parte virides-centibus, elytris viridis, ad suturam fulvo undulato-lineatis aut diverse maculatis et apice rufo marginatis. Long. 7 mill. Brésil. — Espèce des plus distinctes par la forme de son prothorax et les larges fascies, ou macules, claires avoisinant la suture.

Othnius notaticollis n. sp. Satis elongatus, nitidus, mediocre pubescens, niger, antennis thoraceque rufis, illo in disco nigro-metallico ; elytris pallidis multi nigro maculatis ; pedibus testaceis. Long. 5 mill. Nouvelle-Guinée. — Moins étroit que *O. delusus* Pascoe avec les dessins noirs différents.

Othnius tonkineus n. sp. Nigro-subæneus, thorace rufo-notato, elytris late pallidis, signaturis nigris ornatis, femoribus pro parte nigris. Long. 5 mill. Tonkin. — Très voisin du précédent, prothorax largement foncé et denticulé latéralement, fémurs tachés de foncé, massue des antennes un peu rembrunie.

Othnius atrithorax n. sp. Mediocre elongatus, parum pubescens, nitidus, nigro-æneoscens, antennis ad basin, ge-

niculis, tibiis pro parte tarsisque rufis, elytris luteo undulato-trifasciatis ; thorace lateraliter 4 denticulato. Long. 4 mill. Formose. — Plus court que le précédent, avec le prothorax plus nettement denticulé, les pattes plus foncées, etc.

Othnius undulatus n. sp. Mediocre elongatus, parum pubescens, nitidus, nigro-subæneus, thorace antice rufo marginato, lateraliter 4 dentato, et postice rufo notato, antennis ad basin rufis, pedibus testaceis, femoribus et tibiis nigro annulatis, elytris luteo-æneo trifasciatis et ad basin æneo maculatis. Long. 4,5 mill. Birmanie. — Diffère du précédent par le prothorax non entièrement foncé, les élytres clairs à dessins foncés.

Othnius maculatus n. sp. Mediocre elongatus, distincte pubescens, nitidus, nigro-subæneus, thorace antice, aliquot postice, rufo marginato, lateraliter denticulato ; elytris pallidis, antice subæneo maculatis, postice subæneo bifasciatis (forma typica), aut antice signaturis reductis et pro parte obliteratis (v. reductus) ; antennis pedibusque pro majore parte rufis. Long. 3,5-4 mill. Ceylon. — Voisin du précédent et très distinct, à première vue, par les élytres maculés antérieurement et fasciès seulement en dessous du milieu.

Othnius major n. sp. Elongatus, parum nitidus, mediocre pubescens, niger, pro parte subæneus, antennis ad basin pedibusque, femoribus pro majore parte nigris exceptis, rufis ; thorace postice subdenticulato ; elytris nigris, ad basin et ad suturam rufo notatis. Long. 6 mill. — Côte-d'Ivoire. — Espèce très distincte par sa taille avantageuse et la suture flanquée d'une assez longue bande longitudinale rousse.

Scraptia acutipennis n. sp. Elongatus, postice acuminatus, nitidus, testaceus, capite thoraceque rufis, antennis nigris, ad basin rufis, articulo ultimo testaceo. Long. 4,5 mill. Brésil : Jatahy. — Espèce très distincte par sa forme élytrale jointe à la coloration des antennes.

Scraptia Gounellei n. sp. Elongatus, subparallelus, apice modice attenuatus, nitidus, pallido-testaceus, oculis nigris ; thorace infoveolato ; elytris apice breve dehiscentibus, subrotundatis. Long. 4 mill. Brésil : Itatiaya. — A placer près de *S. brasiliensis* Chp. (ex description).

Scraptia pallidicolor n. sp. Angustatus, postice subacuminatus, longe pubescens, nitidus, pallidus, oculis et infra corpore pro parte nigris ; oculis magnis ; thorace breve, postice triimpresso. Long. 3,5 mill. Vénézuéla. — Plus pâle et plus allongé que le précédent avec le prothorax différent.

Scraptia argentina n. sp. Oblongus, subparallelus, nitidus, testaceus, oculis nigris, elytris ad scutellum brunneo notatis (forma typica), aliquot lateraliter aut apice brunneo notatis (var. Wagneri) : thorace ad basin indistincte impresso. Long. 3 mill. Rép. Argentine. — Voisin de *S. obscura* F. G., qui offre une coloration générale obscure.

Scraptia madurensis n. sp. Satis elongatus, nitidus, fortiter punctatus, niger, antennis ad basin, pedibus elytrisque testaceis ; thorace infoveolato. Long. 3 mill. Indes : Madura. — A placer près de *S. malabarica* Chp. (ex description).

Scraptia bruneiensis n. sp. Elongatus, depressus, nitidus, testaceus, elytris ad medium transverse piceo fasciatis ; thorace ad basin triimpresso. Long. 4 mill. Bornéo : Brunei. — A placer près de *S. borneensis* Chp. qui a les élytres concolores.

Scraptia infasciata n. sp. Elongatus, subdepressus, nitidus, testaceus, oculis nigris ; thorace ad basin minute biimpresso. Long. 3,5 mill. Tiji-Solak. — Diffère du précédent par le dessus moins déprimé, le prothorax non impressionné sur le disque, etc.

Scraptia pallidonotata v. nov. brevesignată. Elytris testaceis, ad scutellum et ad medium lateraliter brunneo maculatis. Indes : Madura.

Biophida impressa v. nov. unimaculata. Elytris pallidis, ad humeros nigro notatis. Gabon.

Biophida impressa v. nov. triimpressa. Supra pallidus, thorace mediocre punctato, postice late triimpresso : Gabon.

Biophida innotata n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, antennis pro parte nigris ; thorace dense ruguloso-punctato, ad basin lateraliter parum distincte impresso ; elytris modice punctatis, subparallelis, apice subrotundatis. Long. 6 mill. Côte d'Ivoire. — Voisin de *B. nigrolimbata.* Pic, élytres sans bande noire, prothorax plus robuste, etc.

Formicomus diversicolor n. sp. ♀ Elongatus, nigropiceus, antennis pedibusque anticis pro parte rufis, elytris nigro-submetallicis ; capite postice valde attenuato ; thorace ad basin fortiter tuberculato ; elytris parum elongatis, ad basin mediocre depressis. Long. 5 mill. Congo. — Voisin de *tuberculithorax* Pic, de coloration plus foncée, élytres moins élargis sur les côtés, etc.

Formicomus Pagnoni v. nov. guineensis ♂. Femoribus anticis sat longe dentatis, elytris viridi-cœruleis, antice transverse albo fasciatis. Guinée Portugaise. — Diffère de la forme type par la dent fémorale plus longue et la bande blanche élytrale plus droite.

Formicomus griseofasciatus n. sp. ♀. Elongatus, nitidus, niger, elytris piceo-viridescentibus, antice albo fasciatis, antennis ad basin et femoribus ad basin testaceis ; capite satis lato, postice mediocre attenuato ; thorace antice modice dilatato-rotundato, mediocre punctato ; elytris satis elongatis, apice subrotundatis, post basin fortiter depressis. Long. 4 mill. Congo ; Fort Crampel. — Voisin de *F. albolineatus* Pic, forme plus allongée, subparallèle, prothorax moins robuste.

Formicomus benuensis n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, elytris cyanescentibus, antennis femoribus-

que ad basin testaceis ; capite thoraceque densissime punctatis ; elytris sparse punctatis, post basin depressis ; femoribus anticis late spinosis et tibiis intus dentatis. Long. 4 mill. Afrique : Bénue. — Par la dent fémorale se rapproche de *F. spinifer* Pic, celle-ci est un peu plus courte, l'aspect de l'avant-corps est plus mat, etc.

Formicomus celebensis n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, nitidus, rufescens, antennis apice pedibusque pro parte piceis, elytris piceis, antice vage rufo coloratis ; femoribus anticis spina truncata munitis, tibiis ad medium dilatatis. Long. 4 mill. Célèbes. — Voisin de *F. Biroi* Pic, avant-corps plus fortement ponctué, dent fémorale plus courte et robuste, etc.

Formicomus robustior n. sp. Oblongo-elongatus, parum punctatus, nitidus, piceus, elytris viridescentibus, antennis pedibusque plus minusve rufescentibus ; femoribus anticis in mare spina lata et apice truncata munitis, tibiis intus incisis. Long. 4-8,5 mill. Bornéo. — Très voisin de *F. dentatipes* Pic, plus robuste avec l'avant-corps plus foncé, etc.

Formicomus lineatocollis n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, antennis pedibusque pro parte nigris, thorace in disco longitudinaliter brunneo lineato, elytris satis latis, nigris, ad basin late rufo-testaceo notatis ; femoribus anticis in mare spina valida et subacuta munitis, tibiis subsinuatis. Long. 5 mill. Bornéo. — Voisin de *F. terminatus* Pic et très distinct par la ligne brune du prothorax.

Tomoderus Crampeli n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufus, antennis apice pedibusque pallidioribus ; antennis gracilibus ; capite postice subarcuato ; thorace parum breve, ad basin fere recto et indistincte punctato ; elytris subparallelis, parum depressis, irregulariter punctatis. Long. 3 mill. Congo : Fort Crampel. — A placer près de *T. Jeanneli* Pic, prothorax différent, tête nettement rétrécie derrière les yeux, etc.

Tomoderus excavatus v. nov. impressithorax. Elytris rufis, ad basin excavatis et callosis, pedibus luteis. Guatemala. — Diffère de *T. excavatus* Chp. typique au moins par la coloration plus claire des élytres et les cuisses non marquées de foncé.

Tomoderus forticornis mihi. Oblongus, rufo-testaceus, antice pro parte rufescens, antennis pedibusque testaceis ; capite postice subarcuato ; thorace parum breve, fere insulcato ; elytris convexis, sat regulariter punctatis. Long. 3 mill. République Argentine. — A placer près de *T. brevis* Chp.

Anthicus singularicornis v. nov. Bondroiti ♀. Capite thoraceque nigris, thorace sulcato, elytris breve fulvo 4-notatis. Congo (ex Bondroit).

Anthicus singularicornis v. nov. subsulcatus ♀. Thorace rufo, in disco sulcatulo, elytris pallido maculatis. Afrique Orientale.

Hylophilus (Euglenes) trilineatus n. sp. Oblongo-elongatus, fortiter punctatus, griseo hirsutus, testaceus, pro parte rufescens, oculis nigris, elytris ad suturam longe et lateraliter ad medium piceo lineatis. Long. 2,5 mill. environ. Usambara. — Très voisin de *H. maculipennis* Pic, mais tête rousse, antennes plus longues et dessins foncés des élytres différents.

Hylophilus guyanensis n. sp. Subovatus, fere opacus, dense griseo pubescens, rufus, capite nigro, elytris ad medium late nigro fasciatis, fascia lateraliter dilatata. Long. 2 mill. environ. Guyane Française. — Espèce très distincte par la large fascie noire de ses élytres qui se dilate en avant et en arrière sur les côtés. Peut se placer près de *H. inflatus* Chp.

Hylophilus (Zonantes) maroniensis n. sp. Oblongus, griseo hirsutus, nitidus, niger, antennis pedibusque testaceis, femoribus posticis picco notatis, elytris testaceis, ad medium suboblique et breve fasciatis et ad scutellum

rufo-brunneis. Long. 2 mill. Guyane : Maroni. — Très voisin de *H. brasiliensis* Pic, moins robuste avec la tête plus grosse par rapport au prothorax, antennes plus longues.

Hylophilus (Zonantes) rufithorax v. nov. diversiceps. Testaceus, capite nigro, elytris ad medium breve et lateraliter parum distincte brunneo notatis. Brésil. — Diffère de *H. rufithorax* Pic par la tête plus large par rapport au prothorax, la coloration du dessous plus claire, etc.

Hylophilus bipartitus v. nov. atroapicalis. Elytris apice late nigris. Guadeloupe.

Hylophilus Dufaui v. nov. subjunctus. Maculis testaceis posticis ad suturam junctis. Guadeloupe.

Hylophilus Dufaui v. nov. latejunctus. Maculis testaceis elytrorum valde dilatatis, plus minusve junctis. Guadeloupe.

Hylophilus multinotatus n. sp. Subovatus, opacus, testaceus, capite et corpore infra pro parte nigris, elytris brunneis, undulato et multi griseo fasciatis aut maculatis. Long. 2 mill. Guadeloupe. — A placer près de *H. jamaicanus* Pic.

Hylophilus proprior n. sp. Oblongus, fere opacus, sericeo pubescens, niger, antennis pedibusque pro parte rufescentibus, elytris rufis, in disco plus minusve brunnescentibus. Long. près de 2 mill. Tiji-Solak. — Très voisin de *H. javanus* Pic, antennes plus grêles, élytres de coloration plus claire, etc.

Ictistygna testaceicornis n. sp. ♀. Elongatus, subparallelus, griseo pubescens, capite thoraceque rufis, nigro notatis, antennis, elytris pedibusque rufo-testaceis, capite thoraceque densissime umbilicato-punctatis, elytris sat sparse foveato-punctatis. Long. 11 mill. Australie. — A placer près de *I. laticollis* Chp.

Loboglossa biimpressa n. sp. Elongatus, nitidus, rufes-

cens, oculis nigris, elytris multi griseo maculatis ; thorace breve, lateraliter ad medium subarcuato, postice biimpresso. Long. 8 mill. Bolivie. — Moins allongé que *L. variipennis* Sol. avec le prothorax moins droit, subarqué au milieu puis rétréci vers la base.

Loboglossa inæqualicollis n. sp. Elongatus, parum nitidus, rufo-brunneus, oculis nigris, elytris multi griseo maculatis ; thorace satis breve, lateraliter subarcuato, in disco multi impresso. Long. 10 mill. Brésil. — Distinct, à première vue, du précédent par la structure du prothorax.

Loboglossa depressa n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, oculis nigris, supra sat sparse griseo pubescens ; antennis satis brevibus ; thorace breve, lateraliter subarcuato, ad medium impresso ; elytris depressis. Long. 10 mill. Colombie. — Espèce très distincte par son corps déprimé, la pubescence non disposée en moucheture, etc.

Physiomorphus suturalis n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-piceus, pedibus rufis ; thorace subquadrato, bifoveolato ; elytris satis elongatis, postice parum dilatatis, sutura rufescens et griseo pubescens. Long. 5 mill. Brésil : Tijuca. — Diffère nettement de *P. atricolor* Pic par le prothorax plus droit sur les côtés, la suture nettement pubescente, les pattes plus claires.

Batobiomorphus n. gen. Antennis brevibus ; thorace valde transverso, triimpresso ; elytris latis. — Caractères généraux de *Batobius* F. G., mais antennes plus fortes, prothorax de forme très différente, élytres plus élargis, etc.

Batobiomorphus laticollis n. sp. Parum latus, nitidus, capite postice, palpis pro parte, antennis scutelloque nigris, elytris rufis, antice et postice nigro maculatis, his satis latis ; antennis brevibus, latis ; thorace breve et lato, antice attenuato, in disco late biimpresso et postice impresso. Long. 7 mill. Amérique Méridionale. — Paraît voisin (ex description) de *Laccoderus melanurus* Chp.

Conomorphus bimaculatus n. sp. Elongatus, rufus, oculis nigris, thorace lateraliter nigro notato, elytris ad basin in singulo breve nigro maculatis ; antennis pedibusque testaceis ; thorace breve, in disco longitudinaliter biimpresso. Long. 5 mill. Brésil. — Espèce très distincte par sa particulière coloration élytrale jointe à son prothorax biimpressionné en dessus.

Conomorphus lineatus n. sp. Elongatus, rufus, oculis nigris, thorace lateraliter nigro lineato ; elytris lateraliter nigro-undulato lineatis. Long. 7 mill. Brésil. — Diffère du précédent par les élytres un peu élargis avant l'extrémité, au lieu d'être très atténués postérieurement, et la bande latérale noire de ces organes. A placer près de *C. flavicornis* Chp. : je ne crois pas qu'il en soit simplement une variété.

Conomorphus dentiventris v. diversipes. Antennis nigris, pedibus late rufis, elytris late obscuris, fere concoloribus. Brésil : Goyaz.

Conomorphus longicollis n. sp. Elongatus, rufescens, oculis nigris, elytris ante apicem nigro signatis, antennis pedibusque testaceis ; thorace elongato. Long. 6 mill. Guyane Française. — A placer près de *C. gracilicornis* Chp., antennes plus courtes, tête moins large par rapport au prothorax.

Conomorphus annulipes n. sp. Elongatus, niger, thorace in disco late nigro, elytris castaneis, pro parte in disco et lateraliter nigro lineatis, ante apicem nigro maculatis, antennis pedibusque testaceis, femoribus nigro annulatis. Long. 5 mill. Brésil : Mineira. — Distinct, à première vue, par les élytres longitudinalement lineolés et les cuisses foncées sur leur milieu.

Polypria lagrioides n. sp. Grandis et latus, subdepressus, rufus, antennis apice, oculis, thorace lateraliter, scutello pectoreque nigris, elytris nigris, ad suturam antice et postice late rufo notatis. Long. 12 mill. Brésil. — Es-

pèce très distincte par sa forme élargie et la coloration noire très étendue sur les élytres.

Epicauta incompleta v. nov. bireducta. Niger, capite, antennisque ad basin rufis, thorace nigro, parum pubescente, elytris nigris, luteo marginatis et in disco reducte luteo lineatis, ad suturam medio rufo notatis. Indes.

Epicauta lindiana n. sp. Elongatus, subopacus, niger, albo lineatus, capite late rufo, ruguloso, albo lineato ; antennis late nigris ; thorace ruguloso, nigro, albo lineato et marginato ; elytris rubro, albo lineatis et marginatis; pedibus nigris. Long. 17 mill. Afrique Orientale : Lindi. — Diffère de *E. incompleta* Frm. par les élytres rousses, la tête linéolée de blanc, etc.

Epicauta atricollis n. sp. Angustatus, opacus, dense pubescens, niger, capite, antennis ad basin, elytris, tibiis tarsisque rufis. ♂ antennis brevibus, ad basin late dilatatis. Long. 15-16 mill. Indes. — Ressemble à *E. trichrus* Pal., mais les antennes et les pattes ne sont pas entièrement foncées.

Epicauta fasciculata n. sp. Angustatus, opacus, dense pubescens, niger, capite, antennis pro majore parte elytrisque rufis. ♂ antennis gracilibus, tibiis ad basin nigro fasciculatis. Long. 16 mill. Indes. — Coloration du précédent avec les pattes entièrement foncées, les antennes plus grêles, à premiers articles très longs chez ♂, les pattes antérieures différentes, etc.

Epicauta diversipes n. sp. Angustatus, opacus, dense pubescens, niger, capite, antennis, elytris pedibusque rufis, geniculis brunneis, tarsis pro parte castaneis ; antennis parum elongatis ; femoribus anticis emarginatis. Long. 23 mill. Assam. — Espèce voisine des précédentes, mais à coloration des cuisses rousse.

Synallecula convexa n. sp. Subovatus, parum nitidus, sat dense pubescens, convexus, rufo-testaceus, thorace elytrisque dense punctatis, his minute striatis, antennis ni-

gris, ad basin rufis. Long. 3 mill. Côte d'Ivoire. — Espèce très distincte par la forme très convexe du corps.

Synallecula testacea n. sp. Subovatus, nitidus, sat sparse pubescens, subdepressus, rufo-testaceus, abdomine apice nigro, thorace elytrisque sat sparse punctatis. Long. 3,5 mill. Afrique orientale. — Très distinct du précédent par sa forme subdéprimée, la ponctuation moins dense, les antennes entièrement testacées, etc.

Lagriallecula n. gen. Capite postice strangulato, antennis apice late dilatatis, articulo ultimo breve ; articulo ultimo palparum valde transverso ; elytris latis ; pedibus satis validis, tarsis pro parte appendiculatis. — Ce genre a un faciès de *Lagria* F., et se distingue, à première vue, de *Allecula* F. par la structure des antennes dont les articles 4 à 6 sont triangulaires et les suivants fortement courts et très transverses, subpectinés.

Lagriallecula aeneipennis n. sp. Oblongo-elongatus, postice parum dilatatus, nitidus, sparse griseo pubescens, niger, elytris æneis, pygidio et abdomine apice luteis. — Chez cet insecte, la tête est moins large que le prothorax, et ce dernier n'est pas très large, presque droit sur les côtés avec les angles antérieurs nuls, les deux sont fortement et éparsément ponctués, les élytres bien plus larges que le prothorax sont un peu élargis en-dessous du milieu, puis atténués ensuite, assez fortement et densément ponctués avec des traces de stries faibles. Long. 9 mill. Dahomey.

Pseudomorocaulus major n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, fere glaber, rufus, antennis, articulis primis et ultimo rufis exceptis, pedibusque (femoribus anticis late rufis exceptis) nigris ; thorace marginato, subquadrato, sparse punctato ; elytris satis elongatis, postice attenuatis, fortiter striatis, interstriis convexis, fere impunctatis. Long. 7 mill. Gabon. — Très distinct par sa grande taille jointe à sa coloration.

Pseudocistela atripennis n. sp. Angustatus, rufus, capite pro parte, antennis, elytris, abdomine apice pedibusque pro majore parte nigris. Long. 7 mill: Abyssinie. — Voisin de *C. capitata* Mull. et distinct, à première vue, par les élytres foncés.

Pseudocistela pallidicolor n. sp. Angustatus, testaceus, abdomine apice nigro. Long. 6 mill. Abyssinie. — Coloration générale plus claire que *piceitarsis* Pic et espèces voisines.

Pseudocistela Carnoti n. sp. Elongatus, subopacus, distincto pubescens, rufo-testaceus, thorace lateraliter nigro-vittato, elytris in disco nigro 4-lineatis. Long. 7 mill. Madagascar : Fort Carnot. — Voisin de *P. lineata* Pic, forme plus allongée, prothorax sans bande foncée médiane, etc.

Pseudocistela unilineata n. sp. Elongatus, subopacus, rufus, infra corpore late nigro, thorace in disco nigro unilineato et elytris nigro bilineatis. Long. 5 mill. Madagascar. — Voisin du précédent, mais lignes noires du prothorax et des élytres en nombre différent et autrement placées.

Pseudocistela notaticollis n. sp. Elongatus, subopacus, distincte pubescens, rufo-testaceus, thorace lateraliter et postice nigro notato, elytris in disco nigro bivittatis, sutura nigro marginata, infra corpore pro parte nigro. Long. 7 mill. Madagascar. — Diffère du précédent par la bande noire suturale, le prothorax à bande latérale noire réduite, etc.

Pseudocistela robusta n. sp. Oblongus, robustus, nitidus, viridi-metallicus, elytris testaceis, antennis nigris, pedibus testaceis, femoribus apice nigris. Long. 10 mill. Madagascar. — Espèce très distincte par sa forme robuste jointe à sa coloration.

Cistelampra semiviridis n. sp. Oblongus, nitidus, viridi-metallicus, capite antice, thorace circa, antennis pec-

toreque plus minusve rufis, elytris pedibusque testaceis, his vage metallicis. Long. 8 mill. Madagascar. — Voisin de *C. purpurina* Frm., dessous plus foncé, elytres plus clairs, etc.

Cistelampra majungana n. sp. Oblongus, fere opacus, pro parte viridi-metallicus, pro parte rufus, elytris pedibusque testaceis. Long. 8 mill. Majunga. — A peu près coloré comme le précédent, mais avec les antennes plus courtes et plus robustes, noires à l'extrémité, avant-corps à ponctuation plus dense sur la tête, prothorax alutacé, elytres multiponctués sur les interstries.

Cacoplesia testaceitarsis n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris viridi-metallicis, labro, antennis apice tarsisque testaceis. Long. 12 mill. Tananarive. — Voisin de *E. cœrulans* Frm., membres bicolores, élytres verts, etc.

Cacoplesia viridescens n. sp. Elongatus, nitidus, viridescens, antennis pedibusque nigro-piceis. Long. 14 mill. Fenerine. — Très distinct du précédent par l'avant-corps vert et fortement ponctué, le prothorax plus large, les élytres à stries plus fortement ponctuées.

Cacoplesia cœruleipennis n. sp. Satis elongatus, nitidus, viridi-metallicus, elytris cyaneis, pedibus nigro-piceis, antennis apice testaceis. Long. 11 mill. Diégo-Suarez. — Diffère, à première vue, des précédents, en outre de la coloration, par les élytres plus larges par rapport au prothorax.

Allecula apicicornis n. sp. Satis elongatus, subparallelus, satis nitidus, rufus, antennis apice piceis ; thorace dense punctato, breve, antice subarquato ; elytris thorace parum latis, subparallelis, apice attenuatis, sat fortiter punctato-striatis, interstiis sat fortiter punctatis ; pedibus validis. Long. 7 mill. Gabon : Ogoué. — Peut se placer près de *A. cruralis* Frm., distinct, à première vue, par la forme moins allongée.

Allecula Fochi n. sp. Satis elongatus, antice et postice

attenuatus, nitidus, rufo-testaceus, antennis, articulis ultimis piceis exceptis, pedibusque luteis, femoribus apice nigris ; thorace parum breve, antice attenuato, densissime punctato ; elytris thorace distincte latioribus, fortiter punctato-striatis, interstriis parum et minute punctatis ; pedibus elongatis. Long. 7 mill. Congo : Fort Crampel. — Très distinct du précédent par la forme du corps, les membres plus clairs, etc.

Allecula Fochi v. nov. diversipennis. Parum elongatus, thorace satis lato, rufo, elytris vage submetallicis. Afrique Orientale. — Diffère de *Fochi* Pic par la forme un peu moins allongée, le prothorax plus robuste, les élytres à vagues reflets métalliques.

Allecula forcipifer n. sp. Elongatus, postice valde attenuatus, parum nitidus, castaneus, pro parte rufus, elytris testaceis, antennis pedibusque piceis, femoribus pro parte rufis ; thorace subquadrato, densissime punctato ; elytris striatis, interstriis dense punctatis. Long. 8 mill. Zanzibar. — Peut se placer près de *A. basifemoralis* Pic, forme et coloration différente.

Allecula forcipifer v. nov. beirana. Niger, elytris rufis. Afrique Orientale : Beira.

Allecula subaenescens n. sp. Satis elongatus, nitidus, niger, pro parte rufo tinctus, elytris subæneis, antennis nigris, articulis intermediis plus minusve luteis, pedibus nigris, tibiis pro parte dilutioribus ; tibiis anticis arcuatis et apice paulo dilatatis ; thorace transverso, dense punctato ; elytris subparallelis, postice attenuatis, fortiter striato-punctatis, interstriis fere impunctatis. Long. 7 mill. Afrique Orientale. — Ressemble à *A. ambrensis* Pic, prothorax plus transversal, tibias antérieurs différents, etc.

Allecula diversipes n. sp. Elongatus, subcylindricus, postice valde attenuatus, nitidus, niger, thorace dense punctato, elytris fortiter punctato-striatis, interstriis sub-

carinatis ; pedibus validis, tibiis intus diverse dentatis aut dilatatis. Long: 15 mill. Cochinchine. — Espèce voisine de *A. annamensis* Fl., très distincte par ses pattes, dont les tibias varient de forme suivant les sexes.

Allecula bicoloripes n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, castaneus, antennis pedibusque anticis pallidioribus, pectore elytrisque nigris ; thorace parum transverso, subalutaceo, sparse punctato ; elytris satis latis, apice attenuatis, fortiter sat regulariter punctatis. Long. 13 mill. Chine : Fokien: — Espèce caractérisée par ses élytres dépourvus de stries.

Cistelomorpha joloensis n. sp. Oblongo-elongatus, testaceus, antennis pro parte et segmentibus 2 posticis abdominis nigris.

Tête assez longue ; prothorax court, un peu plus étroit que les élytres ; élytres assez longs, strié-ponctués, à intervalles étroits et larges. Long. 13 mill. Ile Jolo. — De coloration plus claire que *C. luteiceps* Pic avec les élytres à intervalles plus irréguliers.

Cistelomorpha pallidiventris n. sp. Oblongo-elongatus, pallido-testaceus, antennis, articulis primis exceptis, nigris.

Tête assez courte, yeux gros ; prothorax court, peu plus étroit que les élytres ; élytres assez longs, subparallèles, atténués à l'extrémité, strié-ponctués. Long. 8 mill. Sumbawa. — A placer près de *C. melanaera* Frm.

Cistelomorpha geniculata n. sp. Elongatus, subopacus, testaceus, antennis, geniculis, tibiis tarsisque nigris.

Tête peu longue ; prothorax court et large, densément ponctué ; élytres peu plus larges que le prothorax, longs, strié-ponctués, intervalles assez larges. Long. 13 mill. Tonkin. — Voisin de *C. atripes* Frm., mais cuisses non maculées de foncé, etc.

Cistelomorpha lata n. sp. Oblongus, testaceus, anten-

nis, articulis primis exceptis, et segmento ultimo abdominis nigris.

Tête assez longue ; prothorax court, plus étroit que les élytres, densément ponctué ; élytres assez longs et relativement larges, fortement strié-ponctués avec quelques intervalles interrompus postérieurement. Long. 20 mill. Java. — Voisin de *S. sculptipennis* Pic, plus robuste, avec les élytres de sculpture différente.

Cistelomorpha bruneiensis n. sp. Oblongus, rufescens, elytris pallidioribus, antennis nigris, ad basin rufis:

Tête assez longue ; prothorax court, un peu plus étroit que les élytres, densément ponctués ; élytres peu longs, nettement pubescents, strié-ponctués, avec les intervalles plus ou moins larges. Long. 12 mill. Bornéo : Brunei. — Peut se placer près de *C. melanæra* Frm.

Cistelomorpha atropyga n. sp. Oblongus, testaceo-pallidus, antennis pro parte et segmentibus 2 posticis abdominis nigris.

Tête assez longue ; prothorax assez court, subsinué sur le côté, sillonné sur le disque, médiocrement ponctué ; élytres assez longs, strié-ponctués. Long. 10 mill. Sumatra. — Diffère du précédent par la forme du prothorax, les 2 derniers segments de l'abdomen noirs, etc.

Antonaria 4-notata n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, niger, palpis femoribusque testaceis, elytris piceis, ad basin in singulo breve, externe et longe in disco testaceo-fulvo notatis, thorace in disco et lateraliter, elytris ad suturam luteo lineatis. Long. 8 mill: Gabon. — Par la coloration de ses pattes, voisin de *A. femorata* Clav., mais élytres maculés à la base, prothorax à ligne pubescente médiane, etc.

Antonaria modesta v. nov. femoralis. Infra corpore thoraceque lateraliter testaceo notatis, femoribus posticis testaceis, elytris nigris, in disco longe fulvo notatis. Gabon.

Antonaria modesta v. nov. maculata, Thorace lateraliter testaceo notato. Gabon.

Antonaria varicolor v. nov. juncta. Maculis luteis pubescentibus elytrorum ad suturam junctis et pro parte subfasciatis. Gabon.

Colobapsis notatithorax v. nov. fasciatipennis. Elytris rufis, ad basin et ad medium nigro-undulato fasciatis, thorace immaculato. Gabon.

Cryptocephalus flavolimbatus n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, testaceus, infra corpore pro parte, pygidio, elytrisque piceis, his ad scutellum flavo maculatis et lateraliter flavo marginatis. Long. 3 mill. Chine : Yunnan. — Plus allongé que *C. pallidoapicalis* Pic, avec les élytres bordés de pâle sur les côtés.

Cryptocephalus curtipennis n. sp. Minutus, satis latus, nitidus, niger, pedibus pro parte rufescentibus, thorace luteo limbato, elytris nigris, pro-majore parte luteo-limbatis, ad medium luteo fasciatis et apice luteo maculatis. Long. 2 mill. Yunnan. — Par sa forme, se rapproche de *C. thibetanus* Pic, mais coloration bien différente.

Cryptocephalus decastictus v. nov. subconnexus. Elytris nigro bilineatis, lineis postice junctis. Chine : Yunnan.

Cryptocephalus decastictus v. nov. uniarcuatus. Elytris antice nigro binotatis, postice nigro et arcuato fasciatis. Yunnan.

Cryptocephalus decastictus v. nov. sinuatolineatus, Elytris in disco late nigro sinuato-lineatis. Yunnan.

Cryptocephalus piceolimbatus n. sp. Oblongus, nitidus, flavo-testaceus, antennis pro majore parte, thorace postice, scutello pro parte et elytris circa nigro-piceo limbatis. Long. 4,5 mill. Chine. — Cette espèce a le prothorax très convexe, presque lisse, les élytres courts, à rangées assez régulières de points forts, moins marqués postérieurement ; par sa coloration, se rapproche de *C. nigrolimbatus* Jac., mais le dessous du corps n'est pas foncé.

Cryptocephalus seminigrolimbatus n. sp. Oblongus, nitidus, pallidus, antennis pro parte, thorace postice, scutello elytrisque pro parte nigro limbatis, his apice pallidis. Long. 4,5 mill. Chine. — Plus pâle que le précédent avec les épipleures flaves au milieu, le sommet des élytres non marginé de foncé, etc.

Cryptocephalus Lajoyei n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, capite postice pectoreque piceo notatis, femoribus pro parte brunneo maculatis, thorace in disco late nigro bimaculato, elytris nigris, antice late testaceo fasciatis et postice late testaceo-maculatis, minute lineato punctatis. Long. 5 mill. Tonkin : Bao Lac. — Voisin de *C. birmanicus* Jac., mais macules prothoraciques presque jointes, fascie postérieure noire des élytres plus sinuée.

Cryptocephalus punctohumeralis n. sp. Oblongo-parallelus, nitidus, rufo-testaceus, puncto humerale nigro, elytris minute lineato-punctatis. Long. 5 mill. Cochinchine. — Distinct du précédent par la forme subparallèle et par les élytres ornés seulement d'un point huméral noir.

Cryptocephalus binotatithorax n. sp. Oblongo-subparallelus, nitidus, flavus, antennis apice nigris, thorace in disco nigro bimaculato ; elytris minute lineato punctatis. Long. 6 mill. Tonkin. — Plus pâle que le précédent, avec les élytres sans macule humérale noire et le prothorax ayant un point noir de chaque côté du disque.

Cryptocephalus Anceyi n. sp. Subovatus, postice attenuatus, nitidus, supra testaceus, nigro maculatus, infra corpore nigro, testaceo maculato, aut marginato, membris bicoloratis ; elytris minute lineato-punctatis. Long. 6 mill. Saïgon. — Cette espèce ressemble à *C. nilgirensis* Jac. ; elle a la tête maculée de noir près des yeux, le prothorax orné d'un point noir de chaque côté, les élytres bimaculés à la base et fasciées au milieu de noir, les pattes claires avec les cuisses maculées de foncé.

Cryptocephalus subsuturalis n. sp. Subovatus, postice

attenuatus, parum nitidus, rufus, pectore piceo, elytris ad humeros breve et ad suturam postice sat longe nigro-notatis ; elytris sat fortiter lineato punctatis, intervallis minute punctatis. Long. 4 mill. Hanoï. — Voisin de *C. guttifer* Sufr., mais prothorax immaculé et macules noires des élytres moins nombreuses.

Cryptocephalus Baillyi n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, infra corpore nigro, argenteo pubescente, elytris ad suturam testaceo lineatis, ad humeros et post medium breve piceo notatis, antice nigro marginatis, thorace postice nigro marginato, scutello testaceo, nigro cincto. Long. 6 mill. Chine. — Peut se placer près de *C. dichrous* Frm.

Cryptocephalus ramnadensis n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, elytris nigris, apice rufo maculatis, epipleuris pallidis ; élytris mediocre lineato punctatis. Long. 4 mill. Indes : Ramnad. — A placer près de *C. Sikkimensis* Jac., mais non subcylindrique, écusson roux, etc.

Cryptocephalus madurensis n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, thorace piceo maculato, elytris nigris, apice rufo-maculatis, epipleuris pallidis. Long. 3,5 mill. Indes : Madura. — Voisin du précédent, macule apicale plus courte et prothorax maculé de foncé.

Cryptocephalus manturiformis n. sp. Minutus, oblongo-subovatus, rufus, pro parte metallicus, elytris, pygidio et infra corpore viridi-metallicis, antennis pedibusque rufo-testaceis. Long. 2 mill. environ. Japon : Kioto. — Espèce très distincte par sa forme, jointe à sa coloration, pouvant se placer dans le voisinage de *C. amiculus* Billy.

Cryptocephalus baolacanus n. sp. Oblongus, nitidus, niger, antennis ad basin pedibusque (femoribus posticis piceis), testaceis, elytris testaceis, ad humeros breve nigro maculatis et postice nigro fasciatis, his postice nigro marginatis. Long 3,5 mill. Tonkin : Bao Lac. — Voisin de *C. Allardi* Clav., mais bande noire des élytres plus régulière, non rétrécie sur les côtés et pattes presque entièrement testacées.

Cryptocephalus sublunulatus n. sp. Oblongus, nitidus, niger, antennis ad basin pedibusque testaceis, elytris testaceis, ad humeros late nigro maculatis et postice nigro-fasciatis, fascia antice remota, his postice nigro marginatis. Long. 3-4 mill. Saïgon. — Très voisin du précédent, distinct, à première vue, par la macule humérale plus grosse et la fascie qui remonte en avant sur la suture jusque près de l'écusson.

Cryptocephalus atroscutus n. sp. Oblongus, nitidus, niger, capite, antennis ad basin, pedibusque pro majore parte pallido-testaceis, thorace nigro, antice et lateraliter testaceo limbato, elytris testaceis, ad humeros late nigro maculatis et postice nigro undulato-fasciatis, sutura postice nigro marginata. Long. 3 mill. Tonkin. — Voisin des espèces précédentes, mais avec le prothorax non entièrement foncé ; de coloration rappelle *C. simulans* Jac., mais écusson foncé, bordure claire du prothorax très élargie postérieurement, suture noire postérieurement, etc.

Cryptocephalus tricinctus v. nov. Lallieri. Fascia prima nigra elytrorum in disco interrupta. Tonkin.

Cryptocephalus foveatoscutus n. sp. Oblongus, parum nitidus, rufescens, aliquot pro parte brunnescens, elytris ad basin nigro marginatis et pro parte luteo cinctis ; scutello ad basin foveolato ; elytris fortiter lineato-punctatis ; infra corpore argenteo pubescente. Long. 6 mill. Saïgon. — Espèce très distincte par son écusson fovéolé, pouvant prendre place près de *C. nigriceps* Allard.

Cryptocephalus foveatoscutus v. nov. diversemaculatus. Thorace in disco late nigro-piceo bimaculato, elytris ad humeros piceo maculatis et ad medium late piceo maculatis. Saïgon.

Cryptocephalus Deyrollei n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufus, antennis apice nigris, elytris antice nigro bimaculatis et postice fascia nigra reducta ornatis. Long. 5 mill. Cochinchine. — Par ses dessins élytraux se rapproche de *C. abbreviatulus* Sufr., mais macules isolées de la base des élytres, intervalles non surélevés, etc.

TABLE

POUR LE TRENTE-DEUXIÈME FASCICULE

Page.

Nouveautés diverses 1